

Бекас японский
Gallinago hardwickii Gray, 1831

Птица из отряда Ржанкообразные семейства Бекасовые. В народе бекасов называют также иногда барашками, или чиками.

Обитает в черте города Южно-Сахалинска. Предпочитает антропогенный ландшафт. Освоение земель под сельскохозяйственные угодья способствует расселению вида.

В длину бекас достигает 27-29 см (чуть больше скворца), весит около 140 г. Эта птица отличается длинным, прямым, тонким клювом, высокими ногами и относительно длинными крыльями. Вероятно, полигам. Половозрелость наступает в возрасте 2 лет. В кладке 4 яйца. Гнездо помещается в углублении среди травы, обычно на сухом месте вблизи болота, нередко в низких зарослях курильского бамбука. Гнездовой период растянут. Корм - почвенные и наземные насекомые (двукрылые и жуки), дождевые черви, семена трав и т.д. Жирует в илистых и грязевых местах любой ландшафтной зоны – по краям рек, прудов, небольших озёр, на заливных лугах, где имеются хотя бы некоторые заросли травы и кустов.

Бекас всегда начинает полёт с тихим кряканьем. В первые минуты летит покачиваясь, зигзагообразно, отчего подстрелить его в воздухе бывает крайне трудно. При полёте издаваемый им звук чем-то напоминает бляение. Эта удивительная болотная птица умеет не только хорошо летать, но и неплохо бегать, плавать, а также нырять.

Один из основных лимитирующих факторов - случайный отстрел птиц охотниками, которые не отличают японского бекаса от других видов бекасов, разрешенных к отстрелу. Птиц добывают на путях миграций и на зимовках. На сокращение численности вида оказывают влияние весенне-летнее выжигание травы на пастбищах и лугах, распашка залежей, осушение болот, вытаптывание скотом гнезд и птенцов на пастбищах. Ранние кладки нередко гибнут при резком похолодании, выпадении снега и обильных дождях. Основные враги - лисица, большеклювая и чёрная вороны.

Занесен в Красный список МСОП-96, Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложения двусторонних соглашений, заключенных Россией с Японией и Республикой Корея об охране мигрирующих птиц. Охраняется в заповедниках Сихотэ-Алинском, Лазовском, Кедровая Падь, Дальневосточном морском, Курильском и заказниках Приморского края и Сахалинской области.

Необходима организация природоохранных территорий в местах гнездования бекаса, прежде всего комплексного заповедника на полуострове Крильон; следует запретить охоту на все виды куликов в местах обитания японского бекаса.

