

**Красотел Максимовича**  
*Calosoma Maximoviczi Morawitz, 1863*

Жук отряда Жесткокрылые семейства Жужелицы.

Палеархеоарктический вид. В России обитает в краевой части ареала, на её территории известно небольшое число находок этого вида. Распространен на юге Приморского края, Сахалине, Итурупе. На Сахалине известен из района Сусунайского хребта (среднее течение реки Красносельской и гора Чехова, с полуострова Крильон. Вне территории России распространен в восточном Китае, Японии, на о.Тайвань, Корейском полуострове. Можно встретить в черте г. Южно-Сахалинска и по его окраинам.



Жук длиной 21-35 мм. Верх бронзовый, по краям с зелёным отливом, низ чёрный, по бокам - с металлическим блеском. Боковой бортик переднеспинки отчетливый до задних углов. Скульптура надкрылий гомодинамная триплоидная. Вертлюг задних ног без щетинок.

Обитает главным образом в широколиственных и хвойно-широколиственных лесах. Биология вида и образ жизни изучены слабо. Хищник-энтомофаг. В Японии отмечен как единственный враг гусениц волнянок, вредящих лесам. На Сахалине одним из объектов питания взрослых жуков являются гусеницы непарного шелкопряда.

На территории России численность крайне низкая, которая имеет чёткую тенденцию к снижению. В последние десятилетия были сделаны единичные находки. Главная причина сокращения численности - нарушение местообитаний, главным образом в результате вырубki лесов.

Охране вида способствует система ООПТ на юге Сахалина, в частности заказник «Крильон». Дополнительно надо зарезервировать от промышленного освоения таежные и смешанные леса Сусунайского хребта.

Внесен в Красную книгу России, Красную книгу Сахалинской области.