

Кряква чёрная
Anas poecilorhyncha J.R. Forster, 1781

Птица семейства утиных отряда гусеобразных. Малоизученный гнездящийся перелетный вид.

В окрестностях Южно-Сахалинска ежегодно пролетает небольшими скоплениями в период весенних и осенних миграций.

Размером с крякву обыкновенную: длина от 58-63 см, масса 750-1500 г. Клюв чёрный, с жёлтой перевязью у вершины. Самец и самка окрашены одинаково и похожи на самку обыкновенной кряквы: бурые с чёрными пестринами и более светлым брюшком.

От самки обыкновенной кряквы отличается чёрным клювом с жёлтой перевязью у вершины. У сидящей на воде утки видно белое пятно на крыле. Над глазом проходит светлая бровь.

Весной чёрная кряква появляется дружно к маю парами, образование которых происходит раньше. Пролёт продолжается 15-17 дней до середины мая.

В первые дни птицы придерживаются исключительно устьев рек и открытых озёр. Пары их довольно часто приходится наблюдать на открытом зеркале воды, обычно обособленно от других уток.

Кормятся птицы возле уреза воды, плавая по мелководью вдоль берега. В выборе кормов очень пластична, легко приспосабливается к местным условиям. Кормится при помощи фильтрации, отцеживая через роговые пластины клюва мелких водных животных и растительную пищу. Питается растительной пищей (ряской, роголистником и др.), мелкими беспозвоночными, насекомыми, моллюсками, мелкой рыбой, ракообразными, головастиками, даже лягушками.

Гнездо самка строит недалеко от воды под прикрытием кустарников или высокой травянистой растительности. Она делает в почве ямку, обильно выстилает её сухим растительным материалом, куда откладывает первое яйцо. Обычный диаметр самого гнезда 27-29 см и высота бортов над землёй от 4-15 см. В кладке обычно 9 яиц.

Вылупление птенцов происходит в середине лета. Защищая свой выводок, самка имеет обыкновение притворяться раненой, чтобы отвести непрошенных гостей.

Лимитирующими факторами являются: значительный подъём воды в гнездовой период, браконьерский отстрел, гибель яиц, фактор беспокойства со стороны природопользователей, мелиорация, выжигание травяной ветоши и сенокосение в местах гнездования.

Внесена в Красную книгу Сахалинской области и в Список редких охраняемых птиц Дальнего Востока России. Является редким видом на периферии ареала. На Сахалине вид охраняется в заповедниках «Поронайский».

Для поддержания численности необходим запрет охоты, сохранение местообитаний, и охрана птиц на гнездовьях.

