

Малый (тундровый) лебедь *Cygnus bewickii* Yarrell, 1830

Водоплавающая птица отряда Гусеобразные семейства Утиные.

Малый лебедь обитает только на территории России, в тундре Европейской и Азиатской части нашей страны. Ежегодно пролетают клинами над г. Южно-Сахалинском в период миграций.

Тундровый лебедь - наименьший среди лебедей, за что его ещё называют малым. Вес тела – до 5-6 кг, крыло в длину – до 550 мм, длина тела - 1,2-1,3 м. Также как и лебедь-кликун, он имеет по бокам надклювья жёлтый окрас, но он у него не достает до задней кромки ноздрей. Голос малого лебеда также похож на голос кликуна, только тише и ниже.



Как и все лебеди, западный тундровый лебедь – моногамная птица, образующая пары в 2-4 года и на всю жизнь. В области гнездования поселяется на заболоченных травянистых участках тундры, изобилующих озёрами, в поймах северных рек с многочисленными старицами. В период пролёта и зимовок эту птицу можно встретить у морских побережий, в поймах рек, на крупных озёрах и водохранилищах, заливных лугах, пастбищах и пашнях.

На гнездовья прилетает парами. Гнёзда устраивает на низкой или сухой тундре, иногда на берегу водоёма, чаще всего на приподнятом участке, обеспечивающем хороший обзор местности. В кладке обычно 2-4 яйца.

Период роста молодых от момента их вылупления и до подъема на крыло составляет не более 40-45 дней и, следовательно, тундровые лебеди являются гораздо более скороспелыми, чем другие. Насиживают кладку самка и самец.

Питается водной (рдесты и др.) и наземной (злаки, осоки, особенно корни и побеги пушицы, ягоды, клубни картофеля, свекла и др.) растительностью, непременным компонентом питания являются водные беспозвоночные (личинки и куколки ручейников, ракообразные), мелкая рыбешка. Не ныряют, а достают пищу со дна при помощи своей длинной шеи.

Максимальная продолжительность жизни в неволе до 36, в природе до 25 лет. Основные лимитирующие факторы, обуславливающие сокращение численности в отдельных частях ареала - хозяйственное освоение территорий и, связанный с этим, фактор беспокойства, браконьерство в местах размножения, зимовок и на путях пролета, в отдельные годы неблагоприятные условия зимовки, хищничество песцов и крупных чаек в р-нах размножения. К гнездованию приступает лишь незначительная часть половозрелых лебедей, прилетающих на места размножения. Таким образом, ежегодный прирост популяции зависит прежде всего не от успеха гнездования в конкретном году, а от числа загнездившихся лебедей, которое определяется экологической обстановкой на гнездовых территориях. Кроме человека, и у этих лебедей нет настоящих врагов. Песец, завидя лебедя, убегает от него.

Занесен в Красную книгу СССР, России, Сахалинской области. Относится к редким, так как сильно страдает от освоения местообитаний человеком, от браконьерства.