

## Перепел японский *Coturnix japonica Temminck et Schlegel, 1849*

Японский перепел, он же Китайский перепел, он же Азиатский перепел, он же Немой перепел - птица отряда Курообразные семейства Фазановых.

Гнездовой ареал - Сахалин и Монерон. Гнездится и встречается на территориях сельхозугодий в черте г. Южно-Сахалинска.

По внешнему виду, повадкам, образу жизни, схож с обыкновенным перепелом, от которого в полевых условиях отличим лишь по голосу. Вне периода размножения птиц совершенно не слышно, что, видимо, и было отражено в названии птицы.

Основные отличия внешнего вида от перепела обыкновенного сводятся к окраске горла и передней части шеи, которые сплошь светло-коричневые до щёк включительно, причём на этом фоне нередко выделяется чёрно-бурая полоса, идущая от подбородка и расширяющаяся у нижней части горла в своеобразный передничек, или же здесь имеется просто небольшое бурое пятно овальной формы. Из менее чётких отличий можно указать на сравнительно меньшую пестроту затылка, а на рулевых перьях у отдельных особей ярко выражен продольный рисунок в виде светлой наствольной полосы, причём поперечные полосы редуцированы или вообще отсутствуют.

Размеры немого перепела несколько меньше чем у обыкновенного. В целом самки чуть крупнее самцов. Масса около 100 г у самцов и 90 г у самок, длина до 16 см.

Основная пища птиц - семена травянистых растений, преимущественно злаков, остатки насекомых, гусениц, зелёные стебельки.

Сроки миграций и гнездового периода: май и сентябрь. Гнездо с 7 яйцами найдено на острове Монерон в июле.

В период размножения брачный крик самцов слышен с вечерней до утренней зари, в течение всей ночи. Стайность не свойственна этому виду, как правило, в природе встречаются только одиночки, пары и нераспавшиеся выводки.

После того как была установлена способность самки перепела к круглогодичной кладке яиц, началась селекция этой птицы на увеличение продуктивности яиц.

Численность на низком уровне, точных данных нет. Отмечается значительное колебание численности в разные годы, но причины этого процесса не известны.

Северная граница, как и у обыкновенного перепела, видимо, достаточно подвижна, и по мере сельскохозяйственного освоения Дальнего Востока имеет тенденцию продвижения к северу. Во всяком случае, этот вид не отмечен в конце прошлого века ни на Монероне, ни на южном Сахалине.

Вид охраняется в Курильском заповеднике, внесён в Красную книгу Сахалинской области.

