


Сыч мохноногий
Aegolius funereus Linnaeus, 1758

Птица отряда СOVOобразные семейства Совиные. В парковой зоне г. Южно-Сахалинска обитают оседлые особи.

Небольшая сова с крупной широкой головой, с ярко выраженным лицевым диском и маленькими перьевыми ушками. Размер в среднем не превышает размера голубя. Длина 21-27 см, длина крыла 16-19 см, масса - 120-190 г. Самки крупнее самцов. Крылья длинные и широкие. Хвост короткий. Лапы густо оперены до когтей (отчего и происходит название). Окрас мохноногого сыча бурый с белыми пятнами. Последние хорошо заметны на голове, шее, плечах. Низ светло-серый, с нерезкими светло-бурыми пестринами. Глаза и клюв жёлтые, когти чёрные.



Мохноногий сыч ведёт оседлый образ жизни. В отдельных районах бывают заметны осенне-зимние кочевки, которые, вероятно, связаны и с изменениями кормовых условий. Мохноногий сыч - обитатель хвойных лесов, предпочитает высокоствольную темнохвойную тайгу, очень редко встречается в смешанных лесах. Избегает открытых местностей.

Питается лесными мелкими зверьками: полевками, мышами, землеройками, охотясь на них ночью. Зимой, когда многие зверьки находятся под снегом, в рационе его часто встречаются птицы. В этот период иногда он делает запасы корма в дуплах.

Охотится мохноногий сыч, как правило, с присады, расположенной в трёх-четырёх метрах над землёй. Обычно, посидев на одной ветке минут десять и не обнаружив никого, он перелетает метров на семьдесят и вновь высматривает добычу, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону. Его жертвами в бесснежные сезоны чаще всего становятся мышевидные грызуны. Сычи, живущие на берегах водоёмов, изредка приносят к гнезду утят. Вообще же птицы редко становятся добычей мохноногого сыча и случается это чаще зимой. Тогда же удаётся обнаружить и продовольственные запасы сыча - спрятанные в дуплах трупы полёвок, реже воробьиных птиц.

Поедая корм, мохноногий сыч, как и другие совы, при возможности заглатывает его целиком, а не перевариваемые остатки отрыгивает в виде погадок размером 1,5-3,2 см. В отдельных укромных местах, где сычи отдыхают днём, иногда скапливается масса остатков их трапез.

В выборе дупла сычи довольно разборчивы, предпочитают дупла чёрного дятла (желны). Дно дупла сычи выстилают небольшим количеством сухого мха, листьями и стебельками трав. В конце апреля - начале мая в гнезде появляются яйца. Самка откладывает их с интервалом в двое суток, Кладка насчитывает 4-6 яиц. Количество яиц колеблется, видимо, в зависимости от обилия корма. Яйца белые, с незначительным блеском, почти округлой формы.

С целью разработки охранных мер необходимы сохранение дуплистых деревьев, изучение распространения и образа жизни вида в области.

Внесён в Приложение II к Конвенции СИТЕС в Красную Сахалинской области. Охраняется в Курильском и Поронайском заповедниках.