

Малая белая цапля
Egretta garzetta Linnaeus, 1766

Птица отряда Аистообразные семейства Цаплевые.

Малая белая цапля, или чепура-нужда - небольшого размера болотная птица: длина тела 55-65 см, размах крыльев 86-106 см, вес 300-600 г. В Сахалинской области эта цапля встречается в период весенних миграций и летних кочевок. На территории г. Южно-Сахалинска отмечаются на р. Сусуя и сельхозугодиях.

Внешне похожа на большую белую цаплю, отличаясь от неё меньшими размерами, удлинёнными перьями на затылке и груди, и деталями окраски клюва и ног. Оперение - чисто-белое. У цапель очень редкое оперение.



Самец в брачный период имеет на затылке длинный хохол из двух нерассученных перьев, а также такой же длины рассученные перья на груди и плечах, называемые «эгретами». Клюв полностью чёрный. Уздечка (пространство между клювом и глазом) неоперённая, в брачный период красноватая, в остальное время года голубовато-серая. Самки не отличаются от самцов, однако украшающих перьев не имеют.

Держится вблизи различных водоёмов с пресной, солоноватой и соленой морской водой. Не боится человека и часто встречается возле жилья и на пастбищах.

Основу рациона составляет мелкая рыба длиной до 4 см и весом до 20 г. Кроме того, употребляет в пищу лягушек, водяных и наземных насекомых (жуки, личинки стрекоз, кузнечики, саранча, сверчки), паукообразных, ракообразных (бокоплавцы, некоторые креветки), моллюсков (улитки, двустворчатые моллюски), мелких рептилий и птиц. Кормится на мелководье, в поисках пищи использует разнообразные приёмы - неподвижно караулит добычу из засады или бежит по воде с опущенным клювом.

Гнездится колониями - моновидовыми либо совместно с другими болотными птицами. Размер смешанных колоний может достигать нескольких тысяч пар, хотя в случае самостоятельного поселения они обычно не превышают 100 пар. Редко встречаются одиночные гнездящиеся пары. Гнездо в виде перевернутого конуса с прозрачными стенками шириной 30-35 см, устраивается на заломе камыша или тростника невысоко над поверхностью воды, либо на кустарнике или дереве на высоте до 20 м от земли. В обустройстве гнезда заметно распределение обязанностей между птицами - самец добывает строительный материал, а самка укладывает его на место. В колонии расстояние между двумя соседними гнёздами в среднем составляет 1-4 м, реже менее одного метра. В кладке 2-6, редко 8 яиц. Яйца голубовато-зелёные, со слабым блеском, откладываются с интервалом в сутки или двое. Насиживание длится 21-25 дней. Сидят по очереди самец и самка, хотя самка проводит в гнезде гораздо больше времени. Оба родителя кормят птенцов, отрывая пищу из клюва в клюв.

Вне сезона размножения обычно необщительна. В колонии, наоборот, криклива. Летаёт медленно, при этом шею втягивает сильнее, чем большая цапля.

Обычно живёт около 5 лет. Максимальная известная продолжительность жизни отмечена во Франции - 22,4 года.

Занесена в Красную книгу Сахалинской области.