

**Воробей рыжий**  
*Passer rutilans Temminck, 1835*

Птица отряда Воробьинообразные семейства Воробьиные.

Обитает на окраинах г. Южно-Сахалинска.

Рыжий воробей своими размерами и окраской весьма напоминает полевого воробья. Общая длина 13–15 см. Масса 18–24 г. Только вот у самца верх головы и спина каштаново-рыжего цвета, щеки белые, а горло и полоска от клюва к глазу – чёрные, выше её – узкая белая «бровь». Спина каштаново-рыжего цвета, но с чёрными продольными полосками; надхвостье рыжее, без пятен. Грудь серовато-белая с рыжим оттенком. Концы плечевых перьев образуют светлую полосу. Самка буровато-серая без рыжей окраски на голове и спине.



Гнездовой период в мае - августе. Гнезда помещаются в дуплах, чаще всего выдолбленных карликовыми и малыми пестрыми дятлами, реже птицы занимают дупла естественного происхождения. В кладке 5-6, редко 7 яиц. Инкубационный период 11-12 суток. Первые птенцы вылупляются в середине июня. Из повторных кладок - во второй половине июля.

Основная пища - семена травянистых растений и насекомые. Купаясь в песке воробьи чистят перья и избавляются от паразитов. По народной примете подобная песчаная процедура предвещает дождь.

В южной части ареала - обычный вид. Редкий вид на периферии ареала. В России очень редок.

Основной лимитирующий факторы - трансформация местообитаний в результате вырубки дуплистых деревьев и пожаров.

Внесён в Красную книгу РСФСР (1-е издание) и Список редких охраняемых птиц Дальнего Востока России, в Красную книгу Сахалинской области. Охраняется в Курильском и Поронайском заповедниках.